

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 1/26		Applicable le 07/08/2024

TABLE DES MATIERES

1	Biochimie-Immunologie.....	1
1.1	Biochimie-Immunologie (sang).....	1
1.2	Biochimie-Immunologie (urine et liquide)	13
1.3	Gaz du sang.....	16
1.4	Electrophorèse des protides (sang)	17
2	Hématologie	18
2.1	Hématocytologie	18
2.2	Myélogramme	21
2.3	Hémostase	22
2.4	Cytométrie sang / LBA	23
3	Microbiologie : sérologies infectieuses	24
3.1	Sérologies infectieuses	24
	3.2 Biologie moléculaire	26

Les paramètres mis à jour sont précédés du symbole **

1 BIOCHIMIE-IMMUNOLOGIE

1.1 Biochimie-Immunologie (sang)

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Acides biliaires	µmol/l	<10	Wu, Alan H. B. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. St. Louis, MO: Saunders/Elsevier, 2006. 170-171.
ACE	ng/ml	Non fumeurs : <3,8 Fumeurs : <5,5	Etude interne Roche Diagnostics
Acide lactique	mMol/l	0,5-2,2	Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia PA: WB Saunders Company 1995;382-383
Acide Urique (sg)	µmol/l	H : 202-416 F : 143-339	Thefeld W, Hoffmeister H, Busch EW, et al. Normalwerte der Serumharnsäure in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht mit einem neuen enzymatischen Harnsäurefarbstest. Dtsch Med Wschr 1973;98:380-384.
Acide valproïque	µg/ml	50-100	Cloyd JC, Leppik IE. Valproic acid: therapeutic use and serum concentration monitoring. Dans: Taylor WJ, Finn AL, éditeurs. Individualizing Drug Therapy: Practical Applications of Drug Monitoring. New York, NY: Gross, Townsend, Frank, Inc 1981:87-108
ACTH	pg/ml	7,2-63,3	Etude interne Roche Diagnostics
AFP	ng/ml	<7	Etude interne Roche Diagnostics

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 2/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Albumine (turbidimétrie)	G/l	<4j : 28-44 4j-14a : 38-54 >14ans : 35-52	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520. et Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (eds.). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. St Louis, Missouri; Elsevier Saunders 2006;549
Amikacine	mg/l	pic : 60-80 seuil : <2,5	Concentrations thérapeutiques selon ANAES mars 2011
Ammoniémie	µmol/l	F : 11-51 H : 16-60 Pediatrie 0-15j : 56-107	Da Fonseca-Wollheim F. Direkte Plasmaammoniakbestimmung ohne Enteiweißung. Z Klin Chem Klin Biochem 1973;11:426-431 et The Harriet Lane Handbook, 20th edition by Johns Hopkins Hospital, Branden Engorn, MD and Jamie Flerlage, MD,2015 ed
Amylase	UI/L	28-100	Junge W, Wortmann W et al. Development and evaluation of assays for the determination of total and pancreatic amylase at 37 °C according to the principle recommended by the IFCC. Clin Biochem 2001; 34:607-615. Erratum Clin Biochem 2003; 36:161
Anti TPO	U/ml	<34	Etude interne Roche Diagnostics
Antithyroglobuline	U/ml	<115	Etude interne Roche Diagnostics
Apo B	G/l	H : 0,66-1,33 F: 0,6-1,17	Etude interne Roche Diagnostics
Barbituriques sang	Néant	seuil 1000 ng/ml seco	fiche technique fabricant
Benzodiazépines sang	Néant	seuil : 50 ng/ml diazepam ou 300 ng/ml nitra	fiche technique fabricant
Beta 2 microglobuline	mg/l	<60 ans : 0,8-2,4 mg/l >60 ans : <ou = 3 mg/l	Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft 1998; 685-688.
Bilirubine conjuguée	µmol/l	<5	McPherson RA, Pincus MR. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. Saunders Elsevier, 2007:1405.
Bilirubine libre	µmol/l	<17	McPherson RA, Pincus MR. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. Saunders Elsevier, 2007:1405.

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 3/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Bilirubine totale	µmol/l	<21 0-1 jour : 20-137 1-2 jours : 20-222 2-4 jours : 20-290	Thomas L, ed. Labor und Diagnose. Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die Medizinische Diagnostik, 7th ed.: TH-Books Verlagsgesellschaft 2007:259-273. Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation. Pediatrics 2004;114:297-316
C3	G/l	0,9-1,8	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520.
C4	G/l	0,1-0,4	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520.
CA125	UI/ml	<35	Etude interne Roche Diagnostics
CA153	UI/ml	<25	Etude interne Roche Diagnostics
CA199	UI/ml	<27	Etude interne Roche Diagnostics
Calcium (sg)	mMol/l	2,2-2,6 0-10j : 1,9-2,6 10j-12A : 2,25-2,75	Wu AHB, éditeur. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. St Louis, MO: WB Saunders Elsevier 2006:202-207
Carbamazépine	mg/l	8 à 12	Scheuer ML, Pedley TA. The evaluation and treatment of seizures. N Engl J Med 1990;322(21):1468-1474.
Chaînes légères libres Kappa (Freelite)	mg/l	3,3-19,4 Valeurs de référence selon la fonction rénale DFG (ml/min/1,73m ²) 45-59 : 10,0-47,0 30-44 : 12,5-70,8 < 30 : 17,8-117,3	Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS, Bryant S, Lymp JF, Bradwell AR, et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free kappa and free lambda immunoglobulin light chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains. Clin Chem. 2002 Sep;48(9):1437-44 et résultats étude iStopMM, ASH 2022
Chaînes légères libres Lambda (Freelite)	mg/l	5,7-26,3 Valeurs de référence selon la fonction rénale DFG (ml/min/1,73m ²) 45-59 : 9,1-39,2 30-44 : 10,9-52,8 < 30 : 14,5-94,4	Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS, Bryant S, Lymp JF, Bradwell AR, et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free kappa and free lambda immunoglobulin light chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains. Clin Chem. 2002 Sep;48(9):1437-44 et résultats étude iStopMM, ASH 2022
Chlore sg	mMol/l	98-107	Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Fifth Edition, Edited by Carl A. Burtis and Edward R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 2001: 970, 1004, 1009 (ISBN 0-7216-8634-6).
Cholestérol HDL	mMol/l	F >1,2 H >1,0	Recommandations société européenne d'athérosclérose: Eur Heart J,2011;32:1 769-818

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 4/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Cholestérol LDL	mMol/l	Concentrations "cibles" de LDL-Cholestérol à atteindre en fonction de la catégorie de risque cardiovasculaire risque faible SCORE <1%: LDL-Cholestérol <3,0 mmol/l soit <1,16 g/l risque modéré SCORE entre 1 et 5% : LDL-Cholestérol <2,6 mmol/l soit <1 g/l risque élevé SCORE entre 5 et 10% : LDL-Cholestérol <1,8 mmol/l soit <0,7 g/l risque très élevé (SCORE >ou= 10%) : LDL-Cholestérol <1,4 mmol/l soit <0,55 g/l	Recommandations société européenne d'athérosclérose: Eur Heart J (2020) 41, 111-188
Cholestérol total	mMol/l	3,10-5,20	Study group european atherosclerosis society. Strategies for the prevention of coronary heart disease : a policy statement of the european atherosclerosis society. European heart journal 1987;8:77
Cortisol sang	µg/dl	8h : 6,2-18 16h : 2,7-10	Etude interne Roche Diagnostics
Cortisol salivaire	µg/dl	8h : <0.7 16h : < 0.23	Etude interne Roche Diagnostics
CPK	UI/L	H :20-190 F :20-170	Thomas L, Müller M, Schumann G, et al. Consensus of DGKL and VDGH for interim reference intervals on enzymes in serum. J Lab Med 2005;29:301-308.
Créatinine enz (sg)	µmol/l	F 45-84 H 59-104 0-2mois : 27-77 2 mois-3ans : 14-34 3-5ans : 23-37 5-7ans : 25-42 7-9ans : 30-47 9-11ans : 29-56 11-13ans: 39-60 13-15ans : 40-68	Mazzachi BC, Peake MJ, Ehrhardt V. Reference Range and Method Comparison Studies for Enzymatic and Jaffe Creatinine Assays in Plasma and Serum and Early Morning Urine. Clin Lab 2000;46:53-55. Schlebusch H, Liappis N, Kalina E et al. High sensitive CRP and creatinine: Reference Intervals from Infancy to Childhood. J Lab Med 2002; 26:341-346.
Débit Filtration glomérulaire / Clairance créatininique estimée (CKD EPI 2009, COCKROFT)*	ml/min/1,73m ²	Stade 1 : > 90 Maladie rénale chronique* avec DFG normal ou augmenté Stade 2 : 60-89 : Maladie rénale chronique* avec DFG légèrement diminué Stade 3A : 45-59 Insuffisance rénale chronique modérée Stade 3B : 30-44 : Insuffisance rénale chronique modérée Stade 4 : 15-29 : Insuffisance rénale chronique sévère Stade 5 : < 15 Insuffisance rénale chronique terminale	Classification de la maladie rénale chronique selon le DFG (débit filtration glomérulaire) (HAS 2012)

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 5/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
		* Avec marqueurs d'atteinte rénale : protéinurie clinique, hématurie, leucocyturie, ou anomalies morphologiques ou histologiques, ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant plus de trois mois	
CRP	mg/l	<5	Dati F, Schumann G, Thomas L et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520
Digoxine	ng/ml	0,6-1,2	Directives Société européenne de cardiologie 2008 : diagnostic et traitement de l' IC aiguë et chronique
Estradiol Femme	pg/ml	H 26-61 Folliculaire 12-233 Ovulation 41-398 Lutéale 21-341 Menopause <138	Etude interne Roche Diagnostics
Ethanol	G/l	<0,1	(limite de détection)
Facteur rhumatoide	IU/ml	<14	Etude interne Roche Diagnostics
Fer	µmol/l	5,8-34,5	Löhr B, El-Samalouti V, Junge W, et al. Reference Range Study for Various Parameters on Roche Clinical Chemistry Analyzers. Clin Lab 2009;55:465-471.
Ferritine	ng/ml	Enfants : <1 an : 12-327 ng/ml 1 à 6 ans : 6-67 ng/ml Garçon : 7-17 ans : 14-152 ng/ml Fille : 7-15 ans : 7-84 ng/ml Hommes : 30-400 ng/ml Femmes : 15-49 ans : 25-150 ng/ml Au-delà de 49 ans : 15-150 mg/ml	Lotz J, Hafner G, Prellwitz W. Reference Study for Ferritin Assays. Kurzmitteilung Clin Lab 1997;43:993-994. et Reference ranges for adults and children; preanalytical considerations » de Heil W and Ehrhardt V (publication Roche Diagnostics, 2008) Et Physiologically based serum ferritin thresholds for iron deficiency in children and non-pregnant women: a US national health and nutrition examination surveys (NHANES) serial cross-sectional study. Zuguo Mei et al.The lancet Haematology vol 8,8, E572-E582. 2021
Folates	ng/ml	3,9-26,8	Etude interne Roche Diagnostics
FSH	mUI/ml	H 1,5-12,5 Folliculaire 3,5-12,5 Ovulation 4,7-21,5 Lutéale 1,7-7,7 Menopause 26-135	Etude interne Roche Diagnostics
Gentamicine	mg/l	en dose unique journalière : pic : 30-40,0 seuil : <0,5	Concentrations thérapeutiques selon ANAES mars 2011

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 6/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
GGT	UI/l	Adultes : H 8-61 ; F 5-36 0-6M : <204 6M-1an : <34 1 -12ans : <20	Abicht K, El-Samalouti V, Junge W et al. Multicenter evaluation of new GGT and ALP reagents with new reference standardization and determination of 37°C reference intervals. Clin Chem Lab Med 2001;39:Special Supplement pp S 346 et Reference ranges for adults and children; preanalytical considerations » de Heil W and Ehrhardt V (publication Roche Diagnostics, 2008)
Glycémie	mMol/l	Adultes : 4,11-6,05 0-1j : 2,22-3,33 1-5j : 2,78-4,44 5j-12A : 3,33-5,55	Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. Philadelphie. WB Saunders Company, 2006:444-451. Thomas L, ed Blutglucose. In: Thomas L, ed Labor und Daignose, 6th ed. Frankfurt/Main : TH-Books 2005;193-199
Haptoglobine	G/l	0,3-2	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520.
HCG	UI/l	En dehors de la grossesse : Femmes préménopausées <5 Femmes ménopausées <8 Hommes <2.6 Grossesse : Selon le nombre de semaines de grossesse (hors grossesse multiple ou pathologique) : 4 sem : 10 à 750 5 sem : 200 à 7 000 6 sem : 160 à 31 800 7 sem : 3 700 à 165 000 8 sem : 32 000 à 150 000 9 sem : 64 000 à 150 000 10 sem: 46 500 à 190 000 12 sem: 28 000 à 210 000 14 sem: 14 000 à 62 500 15 sem: 12 000 à 71 000 2ème et 3ème trimestres: diminution progressive des taux, puis maintien d'un plateau jusqu'au terme : 8000 à 60000	Etude interne Roche Diagnostics
Hemoglobine glyquée : A1C	% et mmol/mol	Valeurs de référence : 4 à 6 % (20 à 42 mmol/mol) Valeurs cibles : Pour la plupart des patients : HbA1c < ou = 7%. Patientes enceintes ou envisageant une grossesse : HbA1c < ou = 6,5% Personnes âgées, patients avec antécédents de complication macrovasculaire évoluée, IRC sévère : HbA1c < ou = 8% ou 9	Les valeurs de référence sont imposées par le DCCT et l'UKPDS : The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med, 1993 ; 329 :977-986. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet, 1998 ; 352 : 837-853. valeurs cibles : HAS 2013 : Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2- recommandations pour la pratique clinique

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 7/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
HGH	µUI/ml	0-10A : <24 F 10A-17A : <33 H10A -17A : <24 F :>17A : <30 H: >17A : <10	Etude interne Roche Diagnostics
IGA	G/l	Adulte : 0,7 - 4 g/l 0 – 1 an : 0 – 0,14 g/l 1 an – 3 ans : 0 – 0,8 g/l 3 – 6 ans : 0,11 - 1,42 g/l 6 – 14 ans : 0,34 - 2,2 g/l 14 - 19 ans : 0,4 - 2,93 g/l	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520 et Estey MP, Cohen AH, Colantonio DA, et al. CLSI-based transference of the CALIPER database of pediatric reference intervals from Abbott to Beckman, Ortho, Roche and Siemens Clinical Chemistry Assays:Direct validation using reference samples from the CALIPER cohort. Clin Biochem 2013;46:1197–1219
IGG	G/l	Adulte : 7 - 16 g/l 0 – 14 jours : 3,2 – 12,05g/l 15 jours - 1 an : 1,48 – 6,31 g/l 1 - 4 ans : 3,17 - 9,94 g/l 4 – 10 ans : 5,01-11,65 g/l 10 - 19 ans : 5,95 – 13,08 g/l	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520 et Estey MP, Cohen AH, Colantonio DA, et al. CLSI-based transference of the CALIPER database of pediatric reference intervals from Abbott to Beckman, Ortho, Roche and Siemens Clinical Chemistry Assays:Direct validation using reference samples from the CALIPER cohort. Clin Biochem 2013;46:1197–1219
IGM	G/l	Adulte : 0,4 – 2,3 g/l 0 – 14 jours : 0,03 – 0,32 g/l 15 jours – 13 sem : 0,1 – 0,67 g/l 13 sem - 1 an : 0,14 - 0,82 g/l Fille : 1 – 19 ans : 0,45 - 1,78 g/l Garçon : 1 - 19 ans : 0,36 – 1,44 g/l	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520 et Estey MP, Cohen AH, Colantonio DA, et al. CLSI-based transference of the CALIPER database of pediatric reference intervals from Abbott to Beckman, Ortho, Roche and Siemens Clinical Chemistry Assays:Direct validation using reference samples from the CALIPER cohort. Clin Biochem 2013;46:1197–1219
LDH	UI/l	Enfants : 4 à 20 Jours : 225-600 U/L 2 à 15 ans : 120-300 U/L Adultes femme : 135-214 U/L Adultes homme : 135-225 U/L	Lorentz K, Röhle G. Einführung der neuen Standardmethoden 1994 zur Bestimmung der katalytischen Enzymkonzentration bei 37 °C. Klin Chem Mitt 1995;26:290-293
LH	mUI/ml	H 1,7-8,6 Folliculaire 2,4-12,6 Ovulation 14-95,6 Lutéale 1-11,4 Menopause 7,7-58,5	Etude interne Roche Diagnostics

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 8/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Lipase	UI/l	13-60	Junge W, Abicht K, Goldman J et al. Evaluation of the Colorimetric Liquid Assay for Pancreatic Lipase on Hitachi Analyzers in 7 Clinical Centers in Europe, Japan and USA. Clin Chem Lab Med 1999;37, Special Suppl:469
Lithium	mmol/l	Conc minimale efficace : 0,5-0,8 Conc intermédiaire (entre 2 prises) : 0,8 -1,2	Reference Values for Therapeutic and Toxic Drugs. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Fifth Edition, Edited by Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 2001: 1023 (ISBN 0-7216-8634-6) et VIDAL
Magnésium	mMol/l	Enfants : 0 à 5 mois : 0,62-0,91 mmol/l 5 mois à 6 ans : 0,70-0,95 mmol/l 6 à 12 ans : 0,70-0,86 mmol/l Adultes : 0,66-1,07 mmol/l	Wu AHB, éditeur. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4e édition. Philadelphie, PA: WB Saunders Company 2006:706-709
Methotrexate	µmol/l	selon indications d'utilisation : Perfusion courte (3-6h) : seuil de toxicité (à H24 : 10µmol/l; à H48: 1 µmol/l, à H72: 0,1 µmol/l) Perfusion longue (24h) : seuil de toxicité : 0,5 µmol/l à 48h Cf protocole onco hémato pour adaptation doses elvorine et utilisation voraxase	Le Guellec, Blasco, Benz, Hulin pour le groupe Suivi Thérapeutique Pharmacologique de la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique Niveau de preuve du suivi thérapeutique pharmacologique du méthotrexate au décours de son administration à haute-dose..Therapie. 2010 May-Jun;65(3):163-9
Myoglobine	µg/l	H : 28-72 F: 25-58	Etude interne Roche Diagnostics
NSE (Neuron specific enolase)	ng/ml	<17	Etude interne Roche Diagnostics
NT Pro BNP	pg/ml	- dyspnée aiguë : Insuffisance cardiaque exclue si <300 ng/l (ou pg/ml) - Suspicion d'IC chronique : Insuffisance cardiaque exclue si <125 ng/l (ou pg/ml) Au-delà de ces seuils : nécessité d'examens complémentaires	Guidelines 2012 : société européenne de cardiologie:
Osmolarité plasmatique	mosmol/l	280-300	Keller H. Klinisch-chemische Labordiagnostik fAr die Praxis, 2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme; 1991.
Paracétamol	mg/l	10 à 25	Tietz NW. Fundamentals of Clinical Chemistry, 6th ed. Saunders Elsevier 2008.

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 9/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Peptide C	ng/ml	1,1-4,4	Etude interne Roche Diagnostics
Phénobarbital	µg/ml	15-40	Morselli PL. Antiepileptic Drugs in Drug Disposition During Development. Morselli PL, ed. New York, NY: Spectrum 1971;311-360.
Phosphatases Alcalines	UI/l	Adultes : H 40-130; F 35-105 0-14J : 83-248 15J-1an : 122-469 1-10 ans : 142-335 10-13 ans : 129-417 13-15 ans H : 116-468 15-17 ans H : 82-331 17-19 ans H : 55-149 13-15 ans F : 57-254 15-17 ans F : 50-117 17-19 ans F : 45-87	Thomas L, Müller M, Schumann G, Weidemann G et al. Consensus of DGKL and VDGH for interim reference intervals on enzymes in serum. J Lab Med 2005; 29:301-308 et Estey MP, Cohen AH, Colantonio DA, et al. CLSI-based transference of the CALIPER database of pediatric reference intervals from Abbott to Beckman, Ortho, Roche and Siemens Clinical Chemistry Assays: Direct validation using reference samples from the CALIPER cohort. Clin Biochem 2013;46:1197-1219
Phosphore	mMol/l	0,81-1,45 M: 1-30j : 1,25-2,25 F : 1-30j : 1,40-2,50 1-12mois : 1,15-2,15 1-3ans : 1-1,95 4-12ans : 0,95-1,8 13-18ans : 0,85 -1,65	Soldin JS, Brugnara C, Wong EC, éditeurs Pediatric Reference Intervals. 5e édition. Washington, AACC Press 2005:153 et Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, éditeurs. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4e édition. St Louis, MO: Elsevier Inc. 2006:2290
Potassium	mMol/l	3,4-5	Wu AHB. Tietz clinical guide to laboratory tests, 4th ed. St Louis, MO: Elsevier Saunders, 2006.
Préalbumine	g/l	0,2-0,4	Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, éditeurs. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry , 6e édition Philadelphie, Pa: WB Saunders, 2008:297
Procalcitonine	ng/ml	Interprétation des résultats (sepsis) - inf. à 0,50 ng/ml => Infection systémique peu probable - 0,50 à 2,00 ng/ml => Risque infectieux-à surveiller - 2,00 à 10,0 ng/ml => Infection systémique probable - sup. à 10,0 ng/ml => Sepsis sévère très probable Interprétation des résultats (Inf Respiratoires Basses): - inf. à 0,10 ng/ml => Infection bactérienne très peu probable - 0,10 à 0,25 ng/ml => Infection bactérienne peu probable - 0,25 à 0,50 ng/ml => Infection bactérienne probable - sup. à 0,50 ng/ml => Infection bactérienne très probable	selon Christ-Crain M, MüllerB. Swiss Med Wkly 2005;135:451-60 et Christ-Crain M, et al Lancet 2004;363:600-07
Prolactine	ng/ml	H 4,04-15,2 F 4,79-23,3	Etude interne Roche Diagnostics

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 10/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Protéine S100	µg/l	Valeur seuil de 0.1 µg/l chez l'adulte Chez l'enfant : De 0 à 3 mois : <= 0.62 µg/l De 4 à 9 mois : <= 0.35 µg/l De 10 à 24 mois : <= 0.23 µg/l De 25 mois à 16 ans : <= 0.18 µg/l	Etude interne Roche Diagnostics Bouvier D et Al . Reference ranges for the serum S100B protein during the first three years of life. Clin Biochem 2011 ;44 :927-9
Protides	G/l	1-6J : 46-70 7J-6 mois : 44-76 6 mois -1 an : 51-73 1- 2 ans : 56-75 3 -14 ans : 60-80 >15 ans et adultes : 64-83	Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia PA: WB Saunders Company 1995;518-523. Ces valeurs correspondent aux protéines sériques, les protéines plasmatiques sont généralement plus élevées de 0.3 à 0.5 g/l (en raison de la présence du fibrinogène)
PSA	ng/ml	< 40 ans : <1,4 40-49a : <2 50-59ans : <3,1 60-69ans : <4,1 >70ans : <4,4	Etude interne Roche Diagnostics
PTH	pg/ml	17.3-74.1	Etude interne Roche Diagnostics
Réserve Alcaline, CO2, Bicarbonates	mMol/l	22-29	Scott MG, Heusel JW, LeGrys VA, et al. Electrolytes and blood gases, dans Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. 3e édition. Philadelphie, PA: WB Saunders Co 1999:1065-1066
Sodium	mMol/l	136-145	Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Fifth Edition, Edited by Carl A. Burtis and Edward R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 2001: 970, 1004, 1009 (ISBN 0-7216-8634-6).
T3L	pmol/l	3.13-6.75 0-12 mois : 2,91-9.22 1-20 ans : 3.84-7.68	Etude interne Roche Diagnostics et Reference ranges for adults and children; preanalytical considerations » de Heil W and Ehrhardt V (publication Roche Diagnostics, 2008)
T4L	pmol/l	12-22	Etude interne Roche Diagnostics
TGO	UI/l	H10-50 F 10-35	Klauke R, Schmidt E, Lorentz K. Recommendations for carrying out standard ECCLS procedures (1988) for the catalytic concentrations of creatine kinase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and γ -glutamyltransferase at 37 °C. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1993;31:907-909.
TGP	UI/l	H10-50 F 10-35	Klauke R, Schmidt E, Lorentz K. Recommendations for carrying out standard ECCLS procedures (1988) for the catalytic concentrations of creatine kinase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and γ -glutamyltransferase at 37 °C. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1993;31:901-909.
Thyroglobuline	ng/ml	3,5-77	Etude interne Roche Diagnostics

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 11/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Transferrine	G/l	2-3,6	Dati F, Schumann G, Thomas L, et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:517-520.
Tricycliques	Néant	Seuil : 300 ng/ml	fiche technique fabricant
Triglycérides	mMol/l	<1,7	Recommandations société européenne d'athérosclérose: Eur Heart J,2011;32:1 769-818
Troponine T HS	ng/l	<p>valeur initiale H0 (Admission): Si TnT Hs <14 ng/l et début douleur > 6h : diagnostic de SCA rejeté si sujet à bas risque (plus de douleur, score GRACE <140) Si (TnT Hs <14ng/l et début douleur <6h) ou (14ng/l< TnT Hs <50ng/l) : redoser la TnT Hs à H3 et interpréter la cinétique Si TnT Hs >50ng/l* + signes cliniques : Avis cardiological (* Sujet âgé et Insuffisance rénale sévère : privilégier l'interprétation cinétique même si TnT Hs >50ng/l à H0)</p> <p>- valeur à H3 (après admission): Si TnT HS à H0 <14 ng/l et absence de variation (<10 ng/l) : diagnostic de SCA rejeté si sujet à bas risque (plus de douleur, score GRACE <140) Si TnT HS à T0 entre 14 et 50 ng/l et absence de variation (<10 ng/l) : rechercher un diagnostic différentiel Si TnT HS à T0 entre 14 et 50 ng/l et variation significative (>10 ng/l) : Avis cardiological</p>	Etude interne Roche Diagnostics et Recommandations société européenne de cardiologie 2011 et 2015 (Eur Heart J 2012;33,2252-2257; Eur Heart J aout 2015)
TSH	μU/ml	<p>de 0 à 64 ans : 0,27 à 4,2 μUI/ml de 65 à 69 ans : 0,27 à 6 μUI/ml de 70 à 79 ans : 0,27 à 7 μUI/ml de 80 à 89 ans : 0,27 à 8 μUI/ml de 90 à 99 ans : 0,27 à 9 μUI/ml Au delà de 100 ans : 0,27 à 10 μUI/ml</p> <p>Chez la femme enceinte à risque d'hypothyroïdie : seuil supérieur de TSH abaissé à 2.5 μUI/ml</p>	Etude interne Roche Diagnostics et recommandations HAS 15 déc 2022
Urée (sg)	mMol/l	2,8-8	Löhr B, El-Samalouti V, Junge W, et al. Reference Range Study for Various Parameters on Roche Clinical Chemistry Analyzers. Clin Lab 2009;55:465-471.
Vancomycine	mg/l	perf continue : 20-40	Cook FV. Vancomycin revisited. Ann Intern Med 1978;88:813-818
Vitamine B12	pg/ml	191-771	Etude interne Roche Diagnostics

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 12/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
VitD(25 OH D2 et D3)	µg/l	<p>Valeurs souhaitables pour des patients adultes : sup à 30 µg/l</p> <p>Statut vitaminique considéré insuffisant entre 10-30 µg/l</p> <p>Etat carentiel en dessous de 10 µg/l</p> <p>- Surdosage : Un potentiel effet toxique est évoqué pour des valeurs sup à 100 µg/l</p>	<p>Selon le groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses, Benhamou C-L, Souberbielle J-C, Cortet B, Fardellone P, Gauvain J-B, et al. La vitamine D chez l'adulte : recommandations du GRIO. Presse Med 2011;40:673-82</p> <p>et Académie nationale de médecine, Salle,B, Duhamel,JF, Souberbielle,J-C. Statut vitaminique, rôle extra osseux et besoins quotidiens en vitamineD. Rapport, conclusions et recommandations. Paris: ANM; 2012.</p>

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 13/26		Applicable le 07/08/2024

1.2 Biochimie-Immunologie (urine, liquide, selles)

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Acide urique Ur	mMol/l	1ères urines du matin : 2,2-5,5 mM/l urines 24 h : 1,2 - 5,9 mM/j	Krieg M, Gunsser KJ, Steinhagen-Thiessen E, et al. Vergleichende quantitative Analytik klinisch-chemischer Kenngrößen im 24-Stunden-Urin und Morgenerin. J Clin Chem Clin Biochem 1986 Nov;24(11):863-869. et Colombo JP, ed. Klinisch-chemische Urindiagnostik. Rotkreuz: LABOLIFE-Verlagsgemeinschaft 1994:180
Amylase Ur	UI/L	H : 16-491 F : 21-447	Junge W, Wortmann W, Wilke B, et al. Development and evaluation of assays for the determination of total and pancreatic amylase at 37°C according to the principle recommended by the IFCC. Clin Biochem 2001;34:607-615. Erratum Clin Biochem 2003;36:161.
Barbituriques urines	Néant	seuil : 300 ng/ml secobarbital	fiche technique fabricant
Benzodiazépines urines	Néant	seuil : 300 ng/ml nitrazépam	fiche technique fabricant
Bicarbonates urinaires	mMol/l	0-2	
Calcium Ur	mMol/l	2,5-7,5 mM/j	Wu AHB, ed. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th edition. St. Louis (MO): Saunders Elsevier 2006 : 202-207
Calprotectine fécale	µg/g	Différenciation maladie organique et maladie gastro-intestinale fonctionnelle : Valeur seuil négative : 80 µg/g de selles (chez l'adulte et l'enfant de plus de 4 ans, valeurs physiologiquement plus élevées chez les enfants plus jeunes) Valeurs entre 80 et 160 µg/g : témoin d'une inflammation de faible intensité Valeurs supérieures à 160 µg/g : témoin d'une maladie de type organique active Suivi des MICI : Valeur inférieur à 100 µg/g de selles : Patients à faible risque de rechute clinique Valeurs entre 100 et 3000 µg/g : Nécessité d'un contrôle plus rapproché Valeurs supérieures à 300 µg/g : Répéter la mesure et si confirmée déclencher des investigations supplémentaires	Fiche technique fournisseur (issue d'une étude clinique cadre approbation FDA)
Cannabis urines	Néant	seuil : 50 ng/ml	fiche technique fabricant

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 14/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Chlore Ur	mMol/l	110 à 250 mM/j	Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Fifth Edition, Edited by Carl A. Burtis and Edward R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 2001: 970, 1004, 1009 (ISBN 0-7216-8634-6).
Cortisol libre urinaire	µg/24h	11.5-74 µg/24h	Etude interne Roche Diagnostics + corrélation LCMMMS
Créatinine Ur	mMol/l	H 3,54-24,6 mM/l ou 9-19 mM/j F 2,55-20 mM/l ou 6-13 mM/j	Mazzachi BC, Peake MJ, Ehrhardt V. Reference Range and Method Comparison Studies for Enzymatic and Jaffe Creatinine Assays in Plasma and Serum and Early Morning Urine. Clin Lab 2000;46:53-55 et Junge W, Wilke B, Halabi A, et al. Determination of reference intervals for serum creatinine, creatinine excretion and creatinine clearance with an enzymatic and a modified Jaffé method. Clin Chim Acta 2004;344:137-148.
Clairance créatinine mesurée	ml/min	66-143 ml/min	Junge W, Wilke B, Halabi A, et al. Determination of reference intervals for serum creatinine, creatinine excretion and creatinine clearance with an enzymatic and a modified Jaffé method. Clin Chim Acta 2004;344:137-148.
Densité urinaire	Néant	1,015-1,025	
Glucose Ur	mMol/l	0,3-1,1 mM/l	Krieg M, Gunsser KJ, Steinhagen-Thiessen E, et al. Comparative quantitative clinico-chemical analysis of the characteristics of 24-hour urine and morning urine. J Clin Chem Clin Biochem 1986 Nov;24(11):863-869.
Magnésium Ur	mMol/l	3-5,0 mM/j	Wu AHB, ed. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th edition. St. Louis (MO): Saunders Elsevier 2006;706-709.
Micro-albumine	mg/l	< 20 mg/l < 30 mg/j <30mg/g de créatinine H : < 2,5 mg/mmol de créatinine F : < 3,5 mg/mmol de créatinine	Néphrologie & Thérapeutique Microalbuminurie et excréition urinaire d'albumine : recommandations pour la pratique clinique. Jean-Michel Halimi et al. Néphrologie & Thérapeutique Vol 3 - N° 6 - octobre 2007 Page :384-391
Osmolarité urinaire	mosmol /l	600-900	Keller H. Klinisch-chemische Labordiagnostik fÄr die Praxis, 2nd ed. Stuttgart, New York: Thieme; 1991.
pH urinaire		5-6	http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/usualval.htm

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 15/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Phosphore Ur	mMol/l	échantillon : 13-44 mM/l urines 24 h : 13-42 mM/j	Wu AHB, ed. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th edition. St. Louis (MO): Saunders Elsevier 2006;852-855 et Krieg M, Gunsser KJ, Steinhagen-Thiessen E, et al. Vergleichende quantitative Analytik klinisch-chemischer Kenngrößen im 24-Stunden-Urin und Morgenurin. J Clin Chem Clin Biochem 1986 Nov;24(11):863-869
Potassium Ur	mMol/l	25-125	Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Fifth Edition, Edited by Carl A. Burtis and Edward R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 2001: 970, 1004, 1009 (ISBN 0-7216-8634-6).
Protides (Ur + LCR)	g/l	LCR : 0,15-0,45 Uries : <0,15 g/l ou < 0,15 g/j	Junge W, Wilke B, Halabi A, et al. Reference Intervals for Total Protein in Collected and Random Urine using the Benzethonium Chloride Method [Abstract]. Clin Chem 2006;52:157. et Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Company 1995;518-523.
Rapport Protides/Créatinine urinaires	mg/g	Echantillon ou urines de 24h : 0-200 mg/g (soit 0-22.6 mg/mmol)	Groupe de travail de la Société de Néphrologie. Evaluation de la fonction rénale et de la proteinurie pour le diagnostic de la maladie rénale chronique chez l'adulte. Recommandations pour la pratique clinique. Néphrologie et thérapeutique 2009, 5 (4),302-305
Sodium Ur	mMol/l	40-220 mM/j	Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, Fifth Edition, Edited by Carl A. Burtis and Edward R. Ashwood, W.B. Saunders Company, 2001: 970, 1004, 1009 (ISBN 0-7216-8634-6).
Urée Ur	mMol/l	échantillon : 286-595 mM/l urines 24 h : 428-714 mM/j	Wu AHB, ed. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th edition. St. Louis (MO): Saunders Elsevier 2006;1096.

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 16/26		Applicable le 07/08/2024

1.3 Gaz du sang

Examens réalisés	unités	Valeurs de référence artériel (et capillaire)	Valeurs de référence veineux	Valeurs de référence sang de cordon	Bibliographie
pH		7,35-7,45	7,32-7,42	7,14-7,42	Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia PA: WB Saunders Company 1995;382-383 et Fouse BL, Reference range evaluation for cord blood gas parameters. www.acutecaretesting.org. Jun 2002
pCO2	mm Hg	F: 32-45 H : 35-48	41-51	34-78	
pO2	mm Hg	83-108	30-40	3-40	
Saturation en O2	%	95-99	70-75	7-80	
Excès de base	mmol/l	-2 à +2	-2 à +2	-7 à +2	
HCO3-	mmol/l	21-29		NA	Scott MG, Heusel JW, LeGrys VA, et al. Electrolytes and blood gases, dans Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. 3e édition. Philadelphie, PA: WB Saunders Co 1999:1065-1066
Lactates	mmol/l	0,5-2,2		0,5-5	Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia PA: WB Saunders Company 1995;382-383 et Olesen H. Kompendium i laboratoriemedicin, Copenhagen: Foerningen af speciallaeger, 1988
Calcium ionisé	mmol/l	1,15-1,29		NA	Siggaard-Andersen O, Thode J, Wandrup JH. The concentration of free calcium ions in the blood plasma ionized calcium, in: Siggaard-Andersen O, ed. Proceedings of the IFCC expert panel on pH and blood gases held at Herlev Hospital 1980. Copenhagen: Radiometer Medical A/S, 1981: 163-90. Available as AS79.
monoxyde de carbone	%	valeurs seuils d'intoxication : HbCO > 3 % chez les non fumeurs HbCO > 6 % (ou > 40 ppm) chez le fumeur		NA	Circulaire interministérielle DGS/7 C n° 2004-540 du 16 novembre 2004 et DGS/SD7C/DDSC/SDDCPR relative à la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre (selon données OMS)
méthémoglobin	%	<1,5		NA	Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia PA: WB Saunders Company 1995;382-383
P50	mmHg	24-31		NA	Siggaard-Andersen O, Wimberley PD, Fogh-Andersen N, Gøthgen IH. Arterial oxygen status determined with routine pH/blood gas equipment and multiwavelength hemoximetry: reference values, precision and accuracy. Scand J Clin Lab Invest 1990; 50, Suppl 203: 57-66.

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 17/26		Applicable le 07/08/2024

1.4 Electrophorèse des protides (sang)

Examens réalisés	Age	Valeurs usuelles GCS		Bibliographie
		%	g/l	
Albumine	< 6mois	58.9 - 73.4	36.5 - 45.5	
	< 1 an	57.4 - 71.4	37.9 - 47.1	
	< 2ans	57.4 - 69	37.9- 45.5	
	< 7ans	57.5 - 67.7	40.3 - 47.4	
	< 14ans	57.1 - 67.2	40.0 - 47.0	
	Adulte	55.8 - 66.1	40.2 - 47.6	
Alpha1 globuline	< 6mois	3.2 - 11.7	2.0 - 7.3	
	< 1 an	3 - 5	2.0 - 3.3	
	< 2ans	3.2 - 5.4	2.1 - 3.6	
	< 7ans	3.3 - 5.4	2.3 - 3.8	
	< 14ans	3.2 - 4.9	2.2 - 3.4	
	Adulte	2.9 - 4.9	2.1 - 3.5	
Alpha 2 globuline	< 6mois	10.6 - 14	6.6 - 8.7	
	< 1 an	10.2 - 16.1	6.7 - 10.6	
	< 2ans	10.7 - 15.5	7.1 - 10.2	
	< 7ans	10 - 14.8	7.0 - 10.4	
	< 14ans	8.9 - 13	6.2 - 9.1	
	Adulte	7.1 - 11.8	5.1 - 8.5	
Beta 1 globuline	< 6mois	4.8 - 7.9	3.0 - 4.9	
	< 1 an	5.3 - 6.9	3.5 - 4.6	
	< 2ans	5.6 - 7	3.7 - 4.6	
	< 7ans	5.2 - 7	3.6 - 4.9	
	< 14ans	5.1 - 6.9	3.6 - 4.8	
	Adulte	4.7 - 7.2	3.4 - 5.2	
Beta 2 globuline	< 6mois	2.1 - 3.3	1.3 - 2.0	
	< 1 an	2.1 - 3.6	1.4 - 2.4	
	< 2ans	2.3 - 3.5	1.5 - 2.3	
	< 7ans	2.6 - 4.2	1.8 - 2.9	
	< 14ans	2.9 - 5.2	2.0 - 3.6	
	Adulte	3.2 - 6.5	2.3 - 4.7	
Gammaglobuline	< 6mois	3.5 - 9.7	2.2 - 6.0	
	< 1 an	4.2 - 11	2.8 - 7.3	
	< 2ans	5.8 - 12.1	3.8 - 8.0	
	< 7ans	7.7 - 14.8	5.4 - 10.4	
	< 14ans	9.8 - 16.9	6.9 - 11.8	
	Adulte	11.1 - 18.8	8.0 - 13.5	
Rapport Albumine/Globulines	< 6mois	1.3 - 3		
	< 1 an	1.3 - 2.9		
	< 2ans	1.3 - 2.5		
	< 7ans	1.2 - 2.4		
	< 14ans	1.2 - 2.2		
	Adulte			

Etude interne SEBIA

et

G Siest, J Henny, F Schiele. Références en biologie Clinique. Elsevier Option Bio, 1990, p515-529

Et

Establishment of reference ranges for serum protein capillary electrophoresis in the pediatric population V. Bato, B. Pereira, B. Evrard, L. Piot, V. Sapin, A. Fogli. IFCC 2015 Poster

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 18/26		Applicable le 07/08/2024

2 HEMATOLOGIE

2.1 Hématocytologie

Examens réalisés	unités	Valeurs de référence	Bibliographie
NFP			Adulte (pour enfant : voir en bas de tableau)
Leucocytes	G/I (Giga/l)	≥16a : 4-10 13-16a : 4,5-10 3-13a : 5-13 7m-3a : 6-16 3-7m : 7,5-16 1-3m : 6-12,5 8j-1m : 7-16 2-8j : 6-17 2j : 8-23 0j-1j : 9-30	Aide-mémoire hématologie SULTAN 1987 (adulte) J Clin Pathol. 2014 Apr;67(4):341-4 (adulte)
Hématies	T/I (Téra/l)	H : 4,5-5,7 F : 4-5,2 3-16a : 4,1-5,5 7mois-3a : 4-5,3 3-7mois : 3,2-4,8 1-3mois : 3,1-4,3 15j-1mois : 3,1-5,2 0-15j : 4-6	J Clin Pathol. 2014 Apr;67(4):341-4 (adulte)
Hémoglobine	g/dl	H : 13-17 F : 11,5-16 13-16a : 12-16 3-13a : 11-14 1 m-3a : 10-13,5 15j-1m : 11-17 8-15j : 12-20 0-8j : 14-22	Aide-mémoire hématologie SULTAN 1987 (adulte) ANAES 1997 (adulte) J Clin Pathol. 2014 Apr;67(4):341-4 (adulte)
Hématocrite	%	H : 40-54 F : 37-47 13-16a : 35-46 3-13a : 33-42 7m-3a : 31-42 1-7m : 27-41 15j-1m : 30-49 8j-15j : 36-58 1-8j : 40-63 0j : 43-67	Aide-mémoire hématologie SULTAN 1987 (adulte)

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 19/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs de référence	Bibliographie
VGM	fl	82-98 13-16a : 78-93 7-13a : 75-88 3-7a : 73-85 7m-3a : 71-83 3-7m : 75-92 1-3m : 81-101 7j-1m : 89-110 0j-7j : 96-114	ANAES 1997 (adulte)
TCMH	pg	27-32 7-13a : 25-30 7m-7a : 24-29 3-7m : 26-30 1-3m : 27-33 15j-1m : 28-37 7-15j : 30-38 0-7j : 32-39	Aide-mémoire hématologie SULTAN 1987 (adulte)
CCMH	g/dl	32-36	ANAES 1997 (adulte)
CVGR	%	12-15 0-1m : 15-18	Sysmex Xtra Online, mars 2011 (adulte)
Plaquettes	G/I	150-400 2m-6a : 150-500 <2m : 150-400	ANAES 1997 (adulte)
VPM	fl	7,5-11 <16a : 9-11	J Clin Pathol. 2014 Apr;67(4):341-4 (adulte)
Neutrophiles	G/I	1,5-7,5 3-7m : 1-7 15j-3m : 1-5 7-15j : 1-9 3-7j : 1,5-9,5 3j : 3-11 2j : 3-16 1j : 4-19 0j : 5-26	ANAES 1997 (adulte) J Clin Pathol. 2014 Apr;67(4):341-4 (adulte)
Eosinophiles	G/I	< 0,4 <16a : < 0,8	ANAES 1997 (adulte)
Basophiles	G/I	<0,1 <16a : < 0,2	ANAES 1997 (adulte)

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 20/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs de référence	Bibliographie
Lymphocytes	G/I	1,5-4 6-12a : 1,7-5 2-6a : 1,8-7 7m-2a : 2,6-11 7j-7m : 3,5-10 3-7j : 2-8 0-3j: 2-7	ANAES 1997 (adulte)
Monocytes	G/I	0,2-0,8 15j-16a : 0,3-1 <15j : 0,4-3	ANAES 1997 (adulte)
Réticulocytes	G/I	20-100 5-7j : 70-200 0-5j : 150-300	ANAES 1997 (adulte)
Schizocytes	%	1	Rôle du biologiste confronté à la recherche de schizocytes, J.-F. Lesesve and all, Ann Biol Clin 2003, 61 : 505-12
Erythroblastes	%	0	Haematology reference intervals for established and novel parameters in healthy adults, J. M. Pekelharing and all, Diagnostic Perspectives Volume 1 page 01 – 11
VS 1h	mm	0-20	Böttiger LE, Svedberg CA. Normal erythrocyte sedimentation rate and age. Br Med J. 1967;2:85–7.

Bibliographie des valeurs de référence NFP pour l'enfant :

- Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood.
- Christensen RD et al "The CBC : References Ranges for Neonates", Seminars in Perinatology, 2009.
- Bain BJ "Blood Cells Practical Guide", Normal Range p. 198-216, Blackwell Publishing, 2006.
- Simplkin P "Pediatric Hematology", Reference Values p. 792-810, Blackwell Publishing, 2007.
- Lainey E et al "Hémogramme en Pédiatrie : variations physiologiques », RFL n°416.

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 21/26		Applicable le 07/08/2024

2.2 Myélogramme

Examens réalisés	unités	Valeurs de référence	Bibliographie
Blastes totaux	%	15-65 ans : 0 - 5 >65 ans : 0 - 4,5	(1)
Hémoblastes (B1)	%	15-65 ans : 0 - 3 >65 ans : 0 - 3	(1)
Hémoblastes (B2)	%	15-65 ans : 0 - 3 >65 ans : 0 - 3	(1)
Promyélocytes	%	15-65 ans : 0,5 - 6 >65 ans : 0,5 - 6	(1)
Myélocytes neutrophiles	%	15-65 ans : 9 - 17 >65 ans: 8 - 18	(1)
Métamyélocytes neutrophiles	%	15-65 ans : 10 - 22 >65 ans : 9,5 - 21	(1)
Polynucléaires neutrophiles	%	15-65 ans : 19 - 38 >65 ans : 20 - 38	(1)
Eosinophiles totaux	%	15-65 ans : 0 - 5 >65 ans : 0 - 5	(1)
Basophiles totaux	%	15-65 ans : 0 - 1 >65 ans: 0 - 1	(1)
Erythroblastes totaux	%	15-65 ans : 10 - 25 >65 ans : 10- 25	(1)
Proérythroblastes	%	15-65 ans : 0 - 2 >65 ans : 0 - 2	(1)
Erythroblastes basophiles	%	15-65 ans : 0 - 4 >65 ans: 0 - 4	(1)
Erythroblastes polychromatophiles	%	15-65 ans: 1 - 10 >65 ans: 1 - 10	(1)
Erythroblastes acidophiles	%	15-65 ans : 5 - 17 >65 ans : 6 - 18	(1)
Lymphocytes	%	15-65 ans: 5 - 21 >65 ans : 6 - 20	(1)
Plasmocytes	%	15-65 ans : 0 - 3 >65 ans : 0 - 4,5	(1)
Monocytes	%	15-65 ans : 1 - 7 >65 ans : 1 - 7	(1)

(1) Valeurs normales établies sur 240 myélogrammes analysés en 2004/2005 au laboratoire d'hématologie CHU Nantes (étude interne).

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 22/26		Applicable le 07/08/2024

2.3 Hémostase

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	bibliographie
TP	%	>70	
INR		0,8 - 1,2	
INR (sous AVK)	/	2 - 4,5	
TCA ratio	/	0,8 - 1,2	Hémostase et Thrombose, 4ème édition, 1994
fibrinogène	g/l	2 - 4	Samama M., Conard J., Horellou MH, Lecompte T., "Physiologie et exploration de l'hémostase. Paris, Doin, 123-137, 153-155, 1990
temps de thrombine	sec	15 – 20	M.C. Trzeciak, M.H. Denninger : "L'hémostase en questions" ; 2004
TCK ratio	/	0,8 - 1,20	Hémostase et Thrombose, 4ème édition, 1994
D Dimères	ng/ml	< 500	Giansante C., Fiotti N., Cattin L., Da Col P.G., "Fibrinogen Ddimer and thrombin-antithrombin complexes in a random population sample : relationships with other cardiovascular risk factors". Thromb. Haemostasis, 71,5, 581-586, 1994.
facteur II	%	70 - 150	CHU Nantes (bibliographie en cours)
facteur V	%	70 - 150	CHU Nantes (bibliographie en cours)
facteur VII	%	70 - 150	CHU Nantes (bibliographie en cours)
facteur X	%	70 - 150	CHU Nantes (bibliographie en cours)
facteur VIII	%	50 - 200	CHU Nantes (bibliographie en cours)
facteur IX	%	60 - 150	CHU Nantes (bibliographie en cours)
facteur XI	%	60 - 130	CHU Nantes (bibliographie en cours)
facteur Willebrand	%	50 - 200	Veyradier A., Goudemand J. « Recommandations du Centre National de référence de la Maladie de Willebrand » ; Hematologie vol 20, 2014
anti-thrombine	%	80 - 120	Samama M., Conard J., Horellou MH, Lecompte T., "Physiologie et exploration de l'hémostase. Paris, Doin, 123-137, 153-155, 1990
Protéine C	%	70 - 130	Samama M., Conard J., Horellou MH, Lecompte T., "Physiologie et exploration de l'hémostase. Paris, Doin, 169-170, 1990
Protéine S	%	60 - 130	Hémostase en questions (MC Trzeciak, MH Denninger), 1994
dRVVT ratio	/	0,5 - 1,2	
anti Xa HNF	UI antiXa/ml	0.2 - 0.6	Héparine sodique=0.3-0.7 (Despas N. »Suivi biologique de l'héparinothérapie :intérêt clinique et aspects pratiques », Ann Biol Clin 2016 74(6)
anti-Xa HBPM	UI antiXa/ml		énoxaparine : 1.2+/-0.17 dalteparine : 0.6+/-0.25 tinzaparine : 0.87+/-0.15 nadroparine : 1.34+/-0.15 Despas N. »Suivi biologique de l'héparinothérapie :intérêt clinique et aspects pratiques », Ann Biol Clin 2016 74(6)

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 23/26		Applicable le 07/08/2024

2.4 Cytométrie sang / LBA

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	bibliographie
Lignée T			
CD3+	/mm ³	800-2700 10-15a : 800-3500 5-10a : 700-4200 2-5a : 900-4500 9m-2a : 1400-8000 2-9m : 2300-6900 7j-2m : 2300-7000 0-7j : 600-5000	
CD3+CD4+	/mm ³	400-1840 10-15a : 400-2100 5-10a : 300-2000 2-5a : 500-2400 9m-2a : 900-5500 2-9m : 1400-5100 7j-2m : 1700-5300 0-7j : 400-3500	
CD3+CD8+	/mm ³	170-1000 10-15a : 200-1200 5-10a : 300-1800 2-5a : 300-1900 9m-2a : 400-2300 2-9m : 500-2200 7j-2m : 400-1700 0-7j : 200-1900	Adulte : cohorte interne exprimée en percentiles 5-95 Hôpital Erasme Laboratoire hospitalier Universitaire de Bruxelles LHUB-ULB, Site Anderlecht.
Rapport CD4/CD8		1,4-3,2 10-15a : 0,9-3,4 5-10a : 0,9-2,6 2-5a : 0,9-2,9 9m-2a : 0,9-3,9 2-9m : 1,6-3,9 7j-2m : 1,3-6,3 0-7j : 1-2,6	Enfant : Comans-Bitter WM, de Groot R, van den Beemd R, Neijens HJ, Hop WC, Groeneveld K, Hooijkaas H, van Dongen JJ. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood. Reference values for lymphocyte subpopulations. J Pediatr. 1997 Mar; 130(3):388-93.
Lignée B			
**CD19+	/mm ³ %	70-410 4-20 10-15a : 200-600 8-24 5-10a : 200-1600 10-31 2-5a : 200-2100 14-44 9m-2a : 600-3100 15-41 2-9m : 600-3000 13-39 7j-2m : 600-1900 4-26 0-7j : 40-1100 5-22	
Lignée NK			
CD3-CD16+56+	/mm ³	60-650 10-15a : 70-1200 5-10a : 90-900 2-5a : 100-1000 9m-2a : 100-1400 2-9m : 100-1300 7j-2m : 200-1400 0-7j : 100-1900	
LBA Rapport CD4/CD8		0,9-2,5	Revue Médicale Suisse 2012 ; 8 : 2212-8
Monocytes **CD14+16-		< 94%	Tarfi, S. and all, Technical, gating and interpretation recommendations for the partitioning of circulating monocyte subsets assessed by flow cytometry

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 24/26		Applicable le 07/08/2024

3 MICROBIOLOGIE : SEROLOGIES INFECTIEUSES

3.1 Sérologies infectieuses

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Ac anti HBc	Ratio	Positif : < 0,9 Douteux : ≥ 0,9 et <1,1 Négatif : ≥ 1,1	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
Ac anti Hbs	UI/I	Positif: ≥ 10	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
Ag Hbs qualitatif	Ratio	Négatif : < 0,8 Douteux : ≥ 0,8 et <1,2 Positif : ≥ 1,2	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
CMV IgG	UA/ml	Négatif : < 0,5 Douteux : ≥ 0,5 et < 1 Positif : ≥ 1	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
CMV IgM	Ratio	Négatif : <0,7 Douteux : ≥ 0,7 et < 1 Positif : ≥ 1	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
VIH1/VIH2 Combo	Ratio	Négatif : < 0,8 Douteux : ≥ 0,8 et <1,2 Positif : ≥ 1,2	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
VHA Ac totaux	UI/ml	Positif : < 0,9 Douteux : ≥ 0,9 et <1,1 Négatif : ≥ 1,1	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
VHA IgM	Ratio	Négatif : < 0,8 Douteux : ≥ 0,8 et <1,2 Positif : ≥ 1,2	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
VHC dépistage	Ratio	Négatif : < 0,8 Douteux : ≥ 0,8 et <1,2 Positif : ≥ 1,2	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
Rubéole IgG	UI/ml	Négatif : < 9,5 Douteux : ≥ 9,5 et <10,5 Positif : ≥ 10,5	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
Toxo IgG 1ere technique roche	UI/ml	Négatif : <1 Douteux ≥1 et < 30 Positif: ≥30	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
Toxo IgM 1ere technique roche	Ratio	Négatif: <0,8 Douteux :≥0,8 et <1 Positif : ≥1	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
Sars-CoV-2	Ratio	Post vaccination : Supérieur à 253 U/ml (soit 260 BAU/ml) : sujets répondeurs Entre 29 et 253 U/ml (soit 30-260 BAU/ml) : sujets faiblement répondeurs. Inférieur à 29 U/ml (soit 30 BAU/ml) : sujets non répondeurs Post infection : positif si >=0.8 U/ml	Seuils proposés par (HAS,ANSM 2021) pour l'évaluation de la réponse vaccinale (28 j après la dernière injection) et fiche technique fabricant Roche

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 25/26		Applicable le 07/08/2024

Examens réalisés	unités	Valeurs usuelles GCS	Bibliographie
Syphilis EIA Roche	Ratio	Négatif : < 0,8 Douteux : ≥ 0,8 et <1,2 Positif : ≥ 1,2	fiche technique fabricant Roche et incertitude de mesure
Syphilis RPR	Inverse Dilution	Positif: ≥ 1/1	fiche technique fabricant Biorad
Toxo IgG (liaison XL)	UI/ml	Négatif : < 6,5 Equivoque : ≥6,5 et <9,5 Positif : ≥ 9,5	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Toxo IgM (liaison XL)	UA/ml	Négatif : < 6 Equivoque : ≥6 et <8 Positif : ≥ 8	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
EBV VCA IgM	U/ml	Négatif : < 20 Equivoque : ≥ 20 et <40 Positif : ≥ 40	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
EBV VCA/EA IgG	U/ml	Négatif : < 16 Equivoque : ≥ 16 et <24 Positif : ≥ 24	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
EBV EBNA IgG	U/ml	Négatif : <5 Equivoque : ≥5 et <20 Positif : ≥ 20	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
VHE IgM	Indice	Négatif : <0.9 Equivoque : ≥0.9 et <1.1 Positif : ≥ 1.1	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
VZV IgG	mUI/ml	Négatif : < 80 Equivoque : ≥80 et <200 Positif : ≥ 200	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Rougeole IgG	UA/ml	Négatif : < 13,5 Equivoque : ≥13,5 et <16,5 Positif : ≥ 16,5	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Lyme IgG	UA/ml	Négatif : < 10 Equivoque : ≥10 et <15 Positif : ≥ 15	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Parvovirus IgG	Indice	Négatif : < 1.9 Equivoque : ≥2 et <2.5 Positif : ≥ 2.5	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Parvovirus IgM	Indice	Négatif : < 0,8 Equivoque : ≥0,8 et <1,2 Positif : ≥ 1,2	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Mycoplasma pneumoniae IgG	UA/ml	Négatif : < 5.5 Equivoque : ≥5.5 et <14.5 Positif : ≥ 14.5	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Mycoplasma pneumoniae IgM	Indice	Négatif : < 7.5 Equivoque : ≥7.5 et <12.5 Positif : ≥ 12.5	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Helicobacter pylori IgG	Indice	Négatif : < 0,72 Equivoque: ≥0,72 et <0,98 Positif : ≥ 0,98	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure
Quantiferon		Négatif : TB1 et/ou TB2 <0,24 Equivoque : TB1 et/ou TB2 : ≥0,24 et <0,46 Positif : TB1 et/ou TB2 : ≥0,46	fiche technique fabricant Diasorin et incertitude de mesure

GCS BIOLOGIE 85	LABO- FT1026	Valeurs de référence GCS biologie 85 Laboratoire de Biologie Médicale GCS Biologie 85 Les Oudairies Boulevard Stéphane Moreau 85925, La Roche-Sur-Yon Cedex 9 France	Signature de l'approbateur
	Version AG		Dr François SUBIGER
	Page 26/26		Applicable le 07/08/2024

3.2 Biologie moléculaire

Examens réalisés	unités	Domaine de quantification	Bibliographie
Charge virale VIH-1	Copies/ml	20 à 1.10⁷ copies/ml	fiche technique fabricant Roche
Charge virale VHC	UI/ml	10 à 1.10⁸ IU/ml	fiche technique fabricant Cepheid
Charge virale VHB	UI/ml	10 à 1.10⁹ IU/ml	fiche technique fabricant Cepheid