

GCS BIOLOGIE 85	LABO-FT942	REALISATION D'UN PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE DANS LE CADRE D'UNE SUSPICION D'INFECTION RESPIRATOIRE	Signature de l'approbateur
	Version B		Dr Bénédicte LUREAU
	Page 1/1		Applicable le 29/01/2018

Dans tous les cas, lors de ces prélèvements, les professionnels de santé doivent respecter strictement l'application des mesures d'hygiène, précautions complémentaires de type «gouttelettes».

Recommandations pour une bonne réalisation du prélèvement naso-pharyngé :

Se procurer l'écouvillon adéquat auprès du laboratoire.

Avant le prélèvement, un patient encombré doit se moucher.

Maintenir la tête du patient incliné en arrière.

Introduire l'écouvillon dans la narine horizontalement, parallèle au plan du palais, sur deux centimètres environ, pour atteindre la partie postérieure des fosses nasales (*Cf.schéma*).

Procéder alors à un écouvillonnage soigneux, profond et appuyé, en effectuant une rotation lente contre la paroi nasale afin de détacher des cellules.

Procédez de même pour l'autre narine avec le même écouvillon.

Un prélèvement correctement effectué est désagréable et entraîne éternuement et larmoiement

L'écouvillon est ensuite plongé dans le milieu de transport : casser la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche du bouchon.

Acheminer rapidement le prélèvement au laboratoire.

